

PEG[♥]inpol

TOZ



Makrogol 3350
Oral süspansiyon için toz
Kabızlık tedavisinde faydalıdır

CE⁰⁴²⁶
Tıbbi Cihaz

1. ENDİKASYONLAR

PEGinpol, ozmotik bir mekanizma aracılığıyla bağırsakları doğal şekilde düzenleyen laksatif etki gösteren bir tıbbi cihazdır. **PEGinpol** özellikle kronik kabızlıkta ve ara sıra görülen bağırsak düzensizliği vakalarında endikedir. **PEGinpol**, yüksek su bağlama kapasitesi sayesinde, gaitayı yumuşatarak kramp, karın ağrısı veya aciliyet hissine neden olmadan bağırsağın boşaltılmasını kolaylaştırır. Etkinliği zaman içinde azalmaz. Bağırsakta emilmez ya da fermente olmaz, mukoza zarını tahriş etmez ve değişikliğe uğramadan dışkıyla birlikte atılır.

2. BİLEŞİMİ

Bir kavanoz içeriği: 100 g Makrogol 3350.

Yardımcı maddeler: silikon dioksit, aroma verici, sodyum sakarin.

3. AMBALAJ

PEGinpol, ölçeği ile birlikte 100 g'lık Makrogol 3350 içeren bir kavanoz içinde oral süspansiyon için bir tozdur.

4. DOZAJ VE ALIM ŞEKLİ

6 aydan 2 yaşına kadar (12 kg'a kadar): Günde vücut ağırlığı başına 0,8 g ürün.

Örnek olarak:

5-7 kg → 5 g/gün

7-9 kg → 6,5 g/gün

9-12 kg → 8,5 g/gün

2 yaşındaki 11 yaşına kadar (12 kg'dan 20 kg'a kadar):

Günde vücut ağırlığı başına 1 g ürün.

Örnek olarak:

12-15 kg → 10 g/gün

15-18 kg → 12,5 g/gün

18-20 kg → 15 g/gün

11 yaş üzeri (> 20 kg): Günde 10-30 g ürün (5-15 silme ölçek).

Tedaviye verilen yanıtla bağlı olarak doz artırılabilir veya azaltılabilir. Yaş grubuna göre en doğru günlük dozaj, çocuğun kilosuna ve kabızlığın şiddetine göre belirlenmelidir. Her koşulda en doğru dozaj için doktor tavsiyesine başvurulması önerilir. Ürünü çocuklarda sadece doktor tavsiyesiyle kullanınız.

Gerek duyulan maksimum doz normal şartlarda günde 30 g ürünü geçmez. Yukarıda belirtilen dozaja göre, 0,5 g (ilk çentik), 1 g (ikinci çentik) ve 2 g (silme ölçek) miktarda ürün almanıza yardımcı olan çentiklere sahip ölçek yardımıyla gerekli dozda ürünü alınız.

Süspansiyonu, her bir silme tam ölçek doz için (2 g'a eşit) oda sıcaklığında olması koşuluyla yaklaşık 1/4 bardak su (25 ml) veya başka bir içecek (örn. çay, süt, meyve suyu) ile hazırlayınız. Süspansiyonu bu şekilde sulandırılmış haliyle alınız.

Günlük doz gün içinde birkaç kez almak üzere bölünebilir. Hedeflenen doz büyük miktarda su gerektirdiğinde, ürün önceden uygun hacimde su ile sulandırılabilir ve süspansiyon 24 saate kadar kapağı kapatılmış olarak buzdolabında saklanabilir. **PEGinpol**'ün öğünler arasında alınması tavsiye edilir.

5. KONTRENDİKASYONLAR

PEGinpol'ü aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

- Bağırsak stenozu
- Bağırsak perforasyonu
- Enflamatuvar bağırsak hastalıkları (örneğin Crohn hastalığı, ülseratif kolit).

Bağırsak tıkanması durumunda ürünü almayınız.

6. UYARILAR

Oral süspansiyon alım sırasında hazırlanmalıdır. Daha yüksek dozlar beklenmedik yan etkilere neden olabileceğinden, belirtilenden daha fazla miktarda alınmaması tavsiye edilir.

PEGInpol'ü arka arkaya 30 günden fazla kullanmayınız, belirtiler devam ederse doktorunuza danışınız.

Ürüne karşı intolerans göstermeniz durumunda ürünü almayınız.

Bileşenlere ve polietilen glikole karşı bilinen aşırı duyarlılık durumunda ürünü almayınız.

Altı aydan küçük çocuklarda kullanmayınız. **PEGInpol** ile tedavi sırasında, dehidrasyonu önlemek için oral rehidrasyon solüsyonu (ORS) uygulamasıyla birlikte uygun bir beslenme düzeninin takip edilmesi tavsiye edilir; bununla birlikte yine de doktorunuza danışmanız önerilir.

7. DOZ AŞIMI

Doz aşımı, şiddetli ağrı, abdominal distansiyon, elektrolit dengesizliğine sebep olabilecek ishal ve kusmaya yol açabilir. Herhangi bir yan etki görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.

8. OLASI YAN ETKİLER

Gastrointestinal şikayetler, karın guruldaması, karın ağrısı, bulantı ve hafif ishal (özellikle başlangıçta) görülebilir. Aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonlar (deride kızarıklık, ürtiker) nadiren görülür.

Burada belirtilenler dışında herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bir dozu unutmanız halinde, bunu dengelemek için çift doz almayınız, bekleyip bir sonraki dozu alınız.

9. İLAÇLAR VE GIDA TAKVİYELERİ İLE ETKİLEŞİMLERİ

Bugüne kadar ilaçlarla bilinen bir etkileşimi görülmemiştir, ancak ürünün ağızdan uygulanan ilaçlardan veya diğer ürünlerden en az 2 saat arayla alınması tavsiye edilir; Makrogol'ün ozmotik etkisi ve indüklenen gastrointestinal geçiş hızının artması, bunların etkinliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Her koşulda halihazırda başka tedaviler uyguluyorsanız **PEGInpol**'ü almadan önce doktorunuza danışınız.

10. SAKLAMA KOŞULLARI

Serin ve kuru bir yerde, 25 °C'yi aşmayan bir sıcaklıkta, orijinal ambalajında saklayınız. Belirtilen son kullanma tarihi, sağlam ambalajında doğru şartlarda saklanan ürün için geçerlidir. Tıbbi cihazı ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Ambalajı hasarlı olan ürünü kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

11. ÜRÜNÜ İMHA ETME

Son kullanma tarihi geçmiş veya her koşulda imha edilecek olan tıbbi cihaz, yerel mercinin atık yönetimi mevzuatına göre işlem görmelidir. Ürünü veya ambalajını hiçbir koşulda doğaya atmayınız.

Son revizyon: Ocak 2024